

神戸大学医学部附属病院薬剤部  
約束処方一覧（調剤薬局向け資料）

2019年1月18日作成

A 内服薬

ヨウ素製剤

Lugol液（内服）

ヨウ素	1.0 g
ヨウ化カリウム	2.0 g
精製水	全量 30.0 mL

<調製法>

1. 精製水約 1.5 mL をビーカーにとり、これにヨウ化カリウム 2.0 g を加え、ガラス棒で攪拌溶解する。
2. ヨウ素 1.0 g を加え、攪拌溶解する。
3. 精製水を加えて全量 30 mL とする。
4. 濾紙濾過する。

B 外用薬

点耳薬

テイネイ水、耳垢水

炭酸水素ナトリウム	1.0 g
グリセリン	5.0 mL
複合パラベン液※)	0.2 mL
精製水	15.0 mL

<調製法>

1. 滅菌精製水を量り、炭酸水素ナトリウムを溶解させる。
2. グリセリン、複合パラベン液を加えて良く混和する。
3. 濾紙濾過する。

※ 複合パラベン液の調製法

1. 70%プロピレングリコールを作成する。  
(プロピレングリコール 28 mL に精製水を入れ、全量 40 mL とする。)
2. この液の一部を、メチルパラベン 0.78 g、プロピルパラベン 0.42 g を入れたビーカーに入れ、ガラス棒で溶かす。

3. この溶液を 70% プロピレングリコールで洗い込み、全量 30 mL とする。

C 塗布薬

Lugol 液 (外用)

ヨウ素	1.0 g
ヨウ化カリウム	2.0 g
精製水	全量 30.0 mL

<調製法>

1. 精製水約 1.5 mL をビーカーにとり、これにヨウ化カリウム 2.0 g を加え、ガラス棒で攪拌溶解する。
2. ヨウ素 1.0 g を加え、攪拌溶解する。
3. 精製水を加えて全量 30 mL とする。
4. 濾紙濾過する。